



**ग्रामीण कृषि मौसम सेवा**  
भारत मौसम विज्ञान विभाग  
इंदिरा गांधी कृषि विश्व विद्यालय  
रायपुर



## मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 27-09-2022

कांकेर(छत्तीसगढ़) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2022-09-27 ( अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2022-09-28	2022-09-29	2022-09-30	2022-10-01	2022-10-02
वर्षा (मिमी)	10.0	15.0	10.0	3.0	2.0
अधिकतम तापमान(से.)	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0
न्यूनतम तापमान(से.)	23.0	23.0	23.0	22.0	21.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	94	94	90	90	85
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	75	65	72	65	65
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	2.0	3.0	3.0	4.0	4.0
पवन दिशा (डिग्री)	135	158	22	34	288
क्लाउड कवर (ओक्टा)	5	6	7	3	5

### मौसम सारांश / चेतावनी:

भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी मध्यावधि मौसम पूर्वानुमान के अनुसार अगले पांच दिनों में कांकेर जिले के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ , अधिकतम तापमान 32.0 डिग्री से और न्यूनतम तापमान 21.0-23.0 डिग्री से. के सुबह की हवा में 85-94% और शाम की हवा में 65-75% आर्द्रता और आने वाले दिनों में हवा दक्षिण-पश्चिम दिशाओं से 2.0-4.0 किमी प्रति घंटे की गति से चलने . की संभावना है

### सामान्य सलाहकार:

वर्तमान में फसलों में कीट व्याधि का प्रकोप दिखाई दे रहा है ,खेतों का अवलोकन करते रहें कीट के पहचान हेतु फेरोमोन ट्रैप या लाइट ट्रैप का उपयोग करें

### लघु संदेश सलाहकार:

भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा विकसित " MEGHDOOT" मोबाइल एप अपने एंड्राइड मोबाइल में प्ले स्टोर से डाउनलोड करे <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aas.meghdoot>

### फसल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
भिण्डी	भिण्डी की फसल में तोड़ाई के बाद यूरिया 5 - 10 कि ग्रा / एकड़ की दर से डाले तथा माइट कीट की अधिकता होने पर इथीयान 1.5 - 2.0 मि ली /ली पानी की दर से वर्षा रुकने के बाद छिड़काव करे
चावल	वर्तमान में जिले में अधिकांश क्षेत्रों में धान फसल गभोट अवस्था में है उनमें दाना नहीं भरने, पोची होने के लक्षण दिखाई दे रहे हैं इस प्रकार के लक्षण मुख्यतः गंधी बग तथा पेनिकल माईट नामक कीट के प्रभाव से होता है दोनों कीटों द्वारा दानों का रस चूस लिया जाता है जिसके कारण बाली निकलने पर धानों में दूध भराव नहीं हो पाता तथा वे लाल / कत्थई रंग के हो जाते हैं व दानों में बदरा के रूप में विकसित होते हैं।

#### पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
बकरा	पशु बाड़े में बकरियों के लिए जगह की समुचित व्यवस्था रखे एक वयस्क बकरी के लिए 1.25 से 1.50 वर्ग मीटर और गाभिन बकरियों के लिए 2.0 वर्ग मीटर जगह की व्यवस्था करे , बाड़े की छत 3.0 से 3.5 मी.

#### अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह:

अन्य (मृदा / भूमि तैयारी)	अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह
पौध - संरक्षण	माइट या छोटे मकड़ी होने पर प्रोपिकोनाज़ोल या ट्रायसाईक्लाज़ोल 400 मि ली /एकड़ की दर से बारिश नही होने पर छिड़काव करें
सामान्य सलाह	किसी भी प्रकार के दवाओं का छिड़काव प्रभावित क्षेत्रों में ही करे हवा की दिशा का ध्यान रखे दो रासायनिक दवाओं को मिलाकर छिड़काव ना करे